

HIPRADOG DP

Principio activo

Fracción liofilizada: Virus vivo moquillo (CDV) cepa

Lederle $\geq 10^5$ DICT50

Fracción líquida: Virus vivo parvovirus canina (CPV)

cepa C-780916 $\geq 10^7$ DICT50

Laboratorio

HIPRADOG

Categoría

BIOLOGICO

Descripción

Vacuna viva, Moquillo, en liofilizado inyectable; y

Parvovirus canina, en suspensión inyectable

Indicaciones

Perros: Prevención de Parvovirus y Moquillo.

La Parvovirus canina está producida por un virus del género parvovirus, el Parvovirus canino (CPV), que produce una gastroenteritis hemorrágica severa, el cual afecta, en la mayor parte de los casos, a cachorros en las primeras semanas después del destete. El moquillo canino está producido por un morbilivirus de la familia de los paramixovirus, provocando trastornos nerviosos y respiratorios en perros de cualquier edad, sobre todo en las primeras semanas de vida, llegándoles a producir incluso la muerte. Ambas enfermedades tienen una elevada prevalencia y son altamente contagiosas, siendo la vacunación el método de control más eficaz. HIPRADOG DP, vacuna de alto título antigénico, es capaz de generar una respuesta inmune activa en cachorros, incluso durante el periodo de posible interferencia con los anticuerpos maternos, reduciendo al mínimo la posibilidad de fallos vacunales, contribuyendo así, de forma muy importante, en la prevención de los efectos de los virus de la parvovirus y del moquillo caninos.

Especies indicadas

Perros.

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Perros: 1 ml/perro, independientemente de su peso, edad, sexo y raza.

Trasvasar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la fracción liofilizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración.

Es aconsejable administrar la primera vacuna a las 8 semanas y revacunar a las 12 semanas.

En situaciones de riesgo, realizar la primovacuna a las 4-6 semanas de edad y revacunar 3 a 4 semanas más tarde.

Se recomienda una dosis de recuerdo anual.

Vías de administración:





INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA

Subcutánea.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infectocontagiosa.

Como no se ha demostrado la inocuidad de esta vacuna en hembras gestantes, no se aconseja su utilización en estos animales.

Presentación

Envase 10 ds (fracción liofilizada + fracción líquida)