

## Pro-Sec

### Principio activo

Penicilina G Procaína 500.000 U.I.  
Neomicina (como sulfato) 400 mg

### Laboratorio

PROAGRO

### Categoría

ANTIBIOTICO

### Descripción

Jeringa de secado es una asociación antibiótica de amplio espectro que actúa contra los microorganismos causantes de mastitis combatiendo las mastitis no curadas durante la lactancia y previniendo nuevas infecciones mamarias en las primeras 3 semanas del período seco. Contiene Penicilina y Neomicina en altas concentraciones y formuladas en un vehículo de acción prolongada que permiten abarcar en conjunto prácticamente todas las bacterias causantes de mastitis: Estreptococos, Estafilococos, Corynebacterias.



### Indicaciones

Terapia al secado para prevención y tratamiento de mastitis por microorganismos sensibles a Penicilina y Neomicina: Estafilococos tanto sensibles como resistentes a Penicilina G; Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus spp (coagulasa negativos), Streptococcus agalactiae, dysgalactiae y uberis; Streptococcus spp.; Corynebacterium bovis y ulcerans; Actinomices pyogenes; Escherichia coli; Klebsiella sp; Enterobacter aerogenes; Pseudomonas aeruginosa.

### Especies indicadas

Bovinos.

### Dosificación y vías de administración:

#### Dosificación:

Una jeringa intramamaria de Pro-Sec en cada cuarto mamario luego del último ordeño de la lactancia.

#### Vías de administración:

Intramamaria.

### Contraindicaciones y limitaciones de uso

Vacas con antecedentes de alergia a antibióticos B-lactámicos (Penicilina G, Ampicilina, Amoxicilina y Cefalosporinas).

### Presentación

Cajas con 300 jeringas intramamarias.